



**PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA' ACQUISITE ALL'ESTERO
PER L'AMMISSIONE IN GRADUATORIA AL SESTO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2022/2023**

(ART. 4 DEL BANDO APPROVATO CON D.R. N. 610 DEL 15.06.2022)

1) L'allucinazione è:

- a) una percezione fisiologica
- b) una percezione in assenza di uno stimolo esterno
- c) una percezione anomala relativa allo spazio interno del soggetto
- d) l'errata percezione di uno stimolo esterno

2) Secondo il DSM-5, per porre diagnosi di un episodio depressivo i sintomi depressivi devono essere presenti per almeno...

- a) 2 settimane
- b) 4 settimane
- c) 6 settimane
- d) 8 settimane

3) Cosa è lo pneumotorace?

- a) La presenza di sangue nel cavo pleurico
- b) La presenza di aria nel cavo pleurico
- c) La presenza di pus nel cavo pleurico
- d) La presenza di dolore toracico
- e)

4) Si considera ipossico il pz con:

- a) $SO_2 < 94\%$ da EGA
- b) $SO_2 < 94\%$ da saturimetro
- c) $SO_2 < 90\%$ da saturimetro
- d) $SO_2 < 94\%$ da satur+cianosi

5) Come viene definito il processo farmacocinetico che descrive l'escrezione dell'etanolo e di dosi elevate della fenitoina e di aspirina rispetto alla gran parte degli altri farmaci?

- a) Distribuzione
- b) Escrezione
- c) Effetto di primo passaggio
- d) Eliminazione di ordine zero

6) Quale dei seguenti farmaci è associato a effetti inotropo positivi che abbiano rilevanza clinica o un'importanza fisiologica?

- a) Captopril
- b) Dobutamina
- c) Enalapril
- d) Losartan



7) La tipologia di intervento di cataratta più praticato in Italia è:

- a) **Facoemulsificazione**
- b) Estrazione extracapsulare
- c) Reclinatio Lentis
- d) Femtolaser

8) Il fenomeno del "recruitment" è caratteristico di:

- a) Lesione retrococleare
- b) Ipoacusia trasmissiva
- c) **Ipoacusia cocleare**
- d) Nessuna delle precedenti

9) Nella stadiazione TNM delle neoplasie orali il parametro N2c indica:

- a) Singola linfadenopatia ipsilaterale >6cm
- b) Multipla linfadenopatia ipsilaterale <6cm
- c) Massa neoplastica con diametro >4cm
- d) **Linfadenopatie bilaterali <6cm**

10) Una complicanza frequente nelle fratture dell'epifisi prossimale dell'omero e':

- a) esposizione
- b) embolia
- c) **osteonecrosi**
- d) nessuna delle precedenti

11) Il dolore nella spondilite anchilosante è:

- a) **prevalentemente notturno con rigidità mattutina**
- b) prevalentemente serale
- c) esacerbato dal movimento
- d) localizzato al rachide cervicale

12) Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la gastrite cronica è falsa:

- a) È causata principalmente dall'infezione da H. pylori
- b) È diagnosticata solo mediante esame istologico di biopsie gastriche
- c) **È una lesione precancerosa dello stomaco**
- d) In alcuni casi può progredire verso l'atrofia e la metaplasia intestinale

13) L'ipertiroidismo subclinico è caratterizzato laboratoristicamente da:

- a) una riduzione dei livelli di FT3 ed FT4
- b) un aumento dei livelli di FT3 ed FT4
- c) **una riduzione dei livelli di TSH con normali livelli di FT3 ed FT4**
- d) un aumento dei livelli di TSH con normali livelli di FT3 ed FT4

14) I tessuti per essere sottoposti ad esame istologico al microscopio ottico devono subire una serie di trattamenti.

Scegli la sequenza giusta fra quelle proposte:

- a) **Fissazione-Campionamento-Disidratazione-Chiarificazione-Inclusione in Paraffina**
- b) Campionamento-Disidratazione-Chiarificazione-Inclusione in Paraffina
- c) Fissazione-Campionamento-Disidratazione-Inclusione in Paraffina
- d) Fissazione-Chiarificazione-Disidratazione- Inclusione in Paraffina



15) La Stadiazione Patologica del carcinoma del colon e basata su:

- a) Dimensioni della neoplasia
- b) Grado istologico
- c) Sede della neoplasia
- d) **Profondità della infiltrazione**

16) Nella stadiazione del tumore polmonare la TC per la valutazione dell'invasione del mediastino:

- a) È utile specie se eseguita con somministrazione di fluorodesossiglucosio;
- b) **È utile specie se eseguita con mezzo di contrasto iodato;**
- c) È utile specie se eseguita con tecnica ad alta risoluzione;
- d) È utile specie se eseguita con somministrazione mezzo di contrasto paramagnetico.

17) L'ecografia:

- a) È una tecnica diagnostica che utilizza raggi X ed eventualmente mezzo di contrasto con esafluoruro di zolfo;
- b) **È una tecnica diagnostica che utilizza ultrasuoni ed eventualmente mezzo di contrasto con esafluoruro di zolfo;**
- c) È una tecnica diagnostica che utilizza ultrasuoni ed eventualmente mezzo di contrasto iodato;
- d) È una tecnica diagnostica che utilizza ultrasuoni ed eventualmente mezzo di contrasto paramagnetico;

18) L'identificazione del solco centrale (solco di Rolando) sulle immagini TC ed RM ci consente di separare correttamente:

- a) Il lobo temporale dal lobo frontale
- b) Il lobo occipitale dal lobo parietale
- c) Il lobo parietale dal lobo temporale
- d) **Il lobo frontale dal lobo parietale**

19) La dermatite erpetiforme di Dühring si associa a:

- a) Morbo di Crohn
- b) Adenocarcinoma del colon-retto
- c) **Malattia celiaca**
- d) Rettocolite ulcerosa

20) Cosa si intende per innesto cutaneo?

- a) **trasferimento di cute prelevata con completa separazione dal suo sito donatore e trasportata su un sito ricevente**
- b) trasferimento di un tessuto con il suo peduncolo vascolare da una sede corporea ad un'altra
- c) entrambe le precedenti
- d) nessuna delle precedenti

21) La difesa contro i virus è principalmente affidata a:

- a) macrofagi
- b) linfociti B
- c) cellule dendritiche
- d) **linfociti T**



- 22) Nei pazienti affetti da policitemia vera quale valore di ematocrito viene considerato ottimale per una corretta gestione terapeutica?**
- a) < 50%
 - b) compreso tra 45-48%
 - c) < o uguale a 48%
 - d) < 45%
- 23) Quali tra i seguenti segni e sintomi NON rientrano tra quelli classici nel paziente con sindrome nefrosica?**
- a) ipoalbuminemia
 - b) ipercolesterolemia
 - c) ipertensione arteriosa
 - d) edemi generalizzati
- 24) Qual è il sintomo più frequente del tumore vescicale, esclusa l'ematuria:**
- a) Nicturia
 - b) Pollachiuria e urgenza minzionale
 - c) Incontinenza da urgenza
 - d) Mitto urinario ridotto
- 25) Le ernie cerebrali della parte mediale del lobo temporale evidenziabili all'esame dell'encefalo post-mortem si chiamano:**
- a) Subfalcine
 - b) Transtentoriali
 - c) Occipitali
 - d) Transtemporali
- 26) La displasia dell'urotelio è:**
- a) Una lesione preneoplastica che può evolvere in CIS
 - b) Una lesione preneoplastica da cui originano le recidive delle neoplasie papillari
 - c) Una lesione preneoplastica che può infiltrare il connettivo sottoepiteliale
 - d) Una forma di metaplasia
- 27) Qual è il sintomo più frequentemente lamentato da un soggetto affetto da Sclerosi Multipla?**
- a) Disturbi sfinterici
 - b) Spasticità
 - c) Fatica
 - d) Difficoltà nella soluzione di problemi
- 28) Per ipertensione endocranica si intende:**
- a) aumento della pressione sanguigna all'interno delle arterie intracraniche
 - b) aumento della pressione venosa nei seni venosi intracranici
 - c) aumento della pressione liquorale nei ventricoli
 - d) aumento globale della pressione all'interno della scatola cranica
- 29) Quale tra le seguenti condizioni può più probabilmente provocare uno stato confusionale transitorio?**
- a) Un ictus emorragico
 - b) Un attacco ischemico transitorio
 - c) Una intossicazione da farmaci
 - d) Una poussé di sclerosi multipla



30) Il deficit ventilatorio ostruttivo è definito da:

- a) FEV1.0/FVC < 70%
- b) Capacità vitale < 70% del teorico
- c) Capacità polmonare totale < 70% del teorico
- d) FEV1.0/FVC > 70%

31) Il periodo di incubazione dell'influenza è di:

- a) 1-5 ore
- b) 1-3 giorni
- c) 15-20 giorni
- d) Superiore a 2 mesi

32) Quale diametro risulta costituire il "cut off" nella gestione di un AAA (Aneurisma dell'Aorta Addominale) per una eventuale indicazione chirurgica?

- a) 3 CM
- b) 4CM
- c) 7 CM
- d) 5 CM

33) Quali di queste classi di anti-diabetici non dovrebbero essere utilizzati nel paziente anziano?

- a) insulina glargine
- b) biguanidi
- c) sulfaniluree
- d) inibitori dell'enzima DPP-4

34) Quali tra le seguenti sono considerate sindromi aortiche acute?

- a) Dissezione aortica
- b) Ematoma intramurale
- c) Ulcera aortica penetrante
- d) Tutte le precedenti